

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

### Ciclopoli Lösung

1% Lösung

Wirkstoff: Ciclopirox-Olamin

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Ciclopoli Lösung und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Ciclopoli Lösung beachten?
3. Wie ist Ciclopoli Lösung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ciclopoli Lösung aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Ciclopoli Lösung und wofür wird sie angewendet?

Ciclopoli Lösung ist ein Breitspektrum-Antimykotikum. Der Wirkstoff Ciclopirox-Olamin wirkt pilzabtötend auf die meisten, für Haut- und Schleimhauterkrankungen verantwortlichen Pilze.

Ciclopoli Lösung wird angewendet zur Behandlung von Pilzkrankungen der Haut.

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Ciclopoli Lösung beachten?

**Ciclopoli Lösung darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Ciclopirox-Olamin oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Ciclopoli Lösung ist nicht zur Anwendung am Auge geeignet.

## **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Ciclopoli Lösung ist erforderlich:**

*bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern*

Geben Sie Ciclopoli Lösung Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

### **Anwendung von Ciclopoli Lösung zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt.

*Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.*

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

*Schwangerschaft*

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

*Stillzeit*

Ciclopirox-Olamin kann bei stillenden Müttern in die Muttermilch übergehen. Aus diesem Grunde darf Ciclopoli Lösung auf keinen Fall im Brustbereich aufgetragen werden. Von einer Anwendung während der Stillzeit wird daher abgeraten.

## **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Bei kurzfristiger Anwendung von Ciclopoli Lösung ist keine Beeinträchtigung zu erwarten.

## **Ciclopoli Lösung enthält Butylhydroxyanisol**

Butylhydroxyanisol kann örtlich begrenzt Hautreizungen, z. B. Kontaktdermatitis (Entzündung der Haut), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

## **3. Wie ist Ciclopoli Lösung anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, tropfen Sie Ciclopoli Lösung 2 x täglich auf die erkrankten Stellen auf. Reiben Sie die Lösung leicht ein und lassen Sie die Lösung an der Luft trocknen. Am Besten bewährt hat sich die Anwendung nach dem Waschen, Duschen oder Baden. So wird die Lösung durch die Reinigung nicht gleich wieder entfernt und kann ausreichend lange einwirken.

Setzen Sie die Behandlung mit Ciclopoli Lösung bis zum Abklingen der Hauterscheinungen (im Allgemeinen 2 Wochen) fort. Zur Vermeidung von Rückfällen wird empfohlen, die Behandlung darüber hinaus noch 1-2 Wochen weiterzuführen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Ciclopoli Lösung zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge von Ciclopoli Lösung angewendet haben als Sie sollten**

Bislang wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

**Wenn Sie die Anwendung von Ciclopoli Lösung vergessen haben**

Setzen Sie die Behandlung fort ohne Ciclopoli Lösung ein zusätzliches Mal anzuwenden oder eine größere Menge als üblich aufzutragen. Falls Sie die Lösung mehrere Tage nicht angewendet haben, kann die Wirkung beeinträchtigt sein.

**Wenn Sie die Behandlung mit Ciclopoli Lösung abbrechen**

Bei einer vorzeitigen Beendigung der Behandlung besteht die Gefahr, dass die Pilzkrankung wieder von vorne beginnt. Bitte beenden Sie die Behandlung erst dann, wenn Ihr Arzt die Heilung bestätigt.

**Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.****4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

*Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes*

Selten:

- Juckreiz und leichtes Brennen. Diese Erscheinungen können auch Zeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion sein.
- Kontaktdermatitis (Entzündung der Haut)

*Meldung von Nebenwirkungen*

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Ciclopoli Lösung aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Flasche nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 3 Monate bei einer Lagerungstemperatur von höchstens 25°C.

In der Originalverpackung aufbewahren.

Nicht im Kühlschrank lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall (regionale Unterschiede). Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Ciclopoli Lösung enthält**

- Der Wirkstoff ist Ciclopirox-Olamin. 1 ml Ciclopoli Lösung enthält 10 mg Ciclopirox-Olamin.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Milchsäure, Butylhydroxyanisol (Ph. Eur.), Macrogol 400.

### **Wie Ciclopoli Lösung aussieht und Inhalt der Packung**

Ciclopoli Lösung ist eine klare bis leicht gelbliche Lösung.

Ciclopoli Lösung ist in Flaschen mit 30 ml erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Polichem S.A.

50, Val Fleuri

1526 Luxemburg

Luxemburg

### Mitvertrieb:

Almirall Hermal GmbH

Geschäftsbereich Taurus Pharma

Scholtzstraße 3

21465 Reinbek

Telefon: 040/72704-0

Telefax: 040/7229296

info@almirall.de

### **Hersteller**

Alfa Wassermann S.p.A.

Via Enrico Fermi, 1

65020 Alanno (PE)

Italien

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2017.**